

COVID-19 Vaccine Moderna

Lagerung und Handhabung

Gefrierlagerung

Kann eingefroren bis zum Verfallsdatum gelagert werden

-25 bis -15 °C

Nicht auf Trockeneis oder unter -40 °C lagern

Im Originalkarton aufbewahren, um Schutz vor Licht zu gewährleisten.



Jedes Fläschchen vor Gebrauch auftauen

Abbildungen der Fläschchen dienen nur zur Veranschaulichung

2 Stunden und 30 Minuten im Kühlschrank

2 bis 8 °C



ODER

1 Stunde bei Raumtemperatur

15 bis 25 °C



Fläschchen vor der Verabreichung 15 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen

Anweisungen nach dem Auftauen

Undurchstochenes Fläschchen

Maximale Zeiten

30

Tage

Kühlschrank

2 bis 8 °C

12

Stunden

Kühle Lagerung bis zu Raumtemperatur

8 bis 25 °C



Nachdem die erste Dosis entnommen wurde

Maximale Zeit

6

Stunden

Kühlschrank oder Raumtemperatur

Das Fläschchen sollte zwischen 2 und 25 °C gelagert werden. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der ersten Anwendung auf dem Fläschchenetikett.

Durchstochenes Fläschchen nach 6 Stunden verwerfen.



Entnehmen Sie jede 0,5-mL-Dosis des Impfstoffs aus dem Fläschchen, indem Sie für jede Injektion eine neue sterile Nadel und Spritze verwenden, um die Übertragung von Infektionserregern von einer Person zur anderen zu verhindern.

Die Dosis in der Spritze sollte sofort verwendet werden.

Nachdem das Fläschchen zur Entnahme der Erstdosis punktiert wurde, sollte der Impfstoff sofort verwendet und nach 6 Stunden verworfen werden.

Nicht verwendeter Impfstoff oder Abfallmaterial sollte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

NIEMALS aufgetauten Impfstoff wieder einfrieren

moderna®

COVID-19 Vaccine Moderna

Dosierung und Verabreichung

Dosierung und Zeitplan

Der COVID-19 Vaccine Moderna wird intramuskulär als Serie von **zwei Dosen** (je 0,5 ml) verabreicht.
Das empfohlene Intervall beträgt 28 Tage.

Es liegen keine Daten über die Austauschbarkeit des COVID-19 Vaccine Moderna mit anderen COVID-19-Impfstoffen zur Vervollständigung der Impfserie vor. Impfinge, die eine Dosis des COVID-19 Vaccine Moderna erhalten haben, sollten eine zweite Dosis des COVID-19 Vaccine Moderna erhalten, um die Impfserie abzuschließen.

Verabreichung

Nach dem Auftauen und vor jeder Entnahme Fläschchen vorsichtig schwenken. Der Impfstoff ist nach dem Auftauen gebrauchsfertig. **Nicht schütteln oder verdünnen**

Prüfen Sie vor der Injektion jede Dosis auf:

Bestätigen Sie, dass die Flüssigkeit sowohl in der Ampulle als auch in der Spritze **weiß bis cremefarben** ist.

Spritzenvolumen von **0,5 ml** bestätigen.

Der COVID-19 Vaccine Moderna kann weiße oder durchscheinende produktbezogene Partikel enthalten.

Wenn die Dosierung nicht stimmt oder Verfärbungen und andere Partikel vorhanden sind, darf der Impfstoff nicht verabreicht werden.



Geben Sie dem Impfling oder seinem Betreuer einen Impfausweis mit dem Datum, an dem der Impfling zur **ZWEITEN DOSIS** des COVID-19 Vaccine Moderna zurückkehren muss.

Bei Fragen besuchen Sie www.modernacovid19global.com und wählen Sie Ihr Land aus.

INDIKATION

Der COVID-19 Vaccine Moderna ist indiziert für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung von COVID-19, verursacht durch das SARS-CoV-2-Virus, bei Personen ab 18 Jahren.

KONTRAINDIKATION

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen einen der in Abschnitt 6.1 aufgeführten Hilfsstoffe

moderna®